



SADECE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILIR
BRUDOLL GENÇ -A
Enjektabl
LİYOFİLİZE BRUCELLA ABORTUS S-19 AŞISI

ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON LİYOFİLİZATI

BRUDOLL-A Genç sığırların brusellozis'ine karşı hazırlanmış Brucella abortus S 19 aşısı

FARMASÖTİK FORMU:

Farmasötik formu: Attenüe Brucella abortus S 19 aşısı suyu ile hazırlanmış canlı liyofilize pelet ve sulandırma sıvısından oluşmuş aşısı.

KOMPOZİSYONU:

Bir doz aşısı (1ml);

Attenüe Brucella abortus S 19	40-120 x 10 ⁹ CFU/doz
Enzymatic digest of Proteins / Casein	0,125 mg/doz
Sukroz	0,25 mg/doz
Sodyum glutamate	0,05 mg/doz
HEPES	0,01 mmol/doz

ENDİKASYONLAR:

3-6 aylık dişi danalarda Brusellozis'e karşı koruyucu amaçla uygulanır.

KONTRENDİKASYONLAR:

Erkeklerde ve 6 aylıktan büyük hayvanlarda kullanılmaz.

YAN ETKİLER:

Enjeksiyon yerinde bazen görülebilecek küçük sert şişlikler ve geçici bir beden ısısı yükselmesi normal aşısı reaksiyonu olarak değerlendirilir.

HEDEF TÜRLER:

3-6 aylık dişi danalar.

UYGULAMA METODU VE YOLU:

Liyofilize aşısı steril bir enjektöre çekilen 3-4 ml sulandırma sıvısı ile homojenize edilerek aynı enjektörle sulandırma sıvısına katılıp, karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Aşısı şişesi karıştırma işlemi aşılama sonuçlanıncaya kadar tekrarlanmalıdır.

3-6 aylık dişi danalara boynun sol tarafından 1 ml deri altı olarak uygulanır. Aşılama her hayvan için ayrı iğne kullanılmalıdır. 6 aylıktan büyük dişi hayvanlara ve erkek hayvanlara uygulanmaz.

UYARILAR:

Sulandırılan aşısı en geç 6 saat içinde tüketilmelidir. Yüksek ısı ve güneş ışığına maruz kalmış aşılama kullanılmamalıdır.

Aşısı uygulanacak hayvanlar sağlıklı olmalıdır. Aşısı uygulamalarında asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır.

BRUDOLL-A Genç yalnızca veteriner hekim veya hekim gözetimindeki sağlık teknisyenlerince uygulanmalıdır.

SADECE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN KULLANILIR
BRUDOLL GENÇ -A
Enjektabl
LİYOFİLİZE BRUCELLA ABORTUS S-19 AŞISI



ENJEKSİYONLUK SÜSPANSİYON LİYOFİLİZATI

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNLEMLER:

Brucella abortus S 19 attenüe suşu olmasına rağmen insanlarda hastalık yapmaya muktedirdir. Dolayısı ile bakteri ile uygun biyogüvenlik önlemleri alınarak çalışılmalıdır. Aşılama esnasında eldiven kullanılmalı ve gerektiğinde kullanılmak üzere antiseptik solüsyon hazır bulundurulmalıdır. Aşının sulandırılması ve sulandırılmış aşının uygulanması esnasında hatalı uygulama, göz ve deri kontaminasyonundan kaçınılmalıdır. Kazara oluşabilecek temaslarda tıbbi müdahale aranmalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA YASAL ARINMA SÜRESİ:

Aşılama hayvanların 90 gün süreyle kesilmemesi tavsiye olunur.

SAKLAMA KOŞULLARI

Karanlıkta +2/+8°C buzdolabı ısısında

AMBALAJ ŞEKLİ:

5 doz liyofilize toz içeren tip I cam flakon ve 5 ml sulandırma sıvısıyla birlikte plastik viyol içinde
5 adet liyofilize toz ve 5 adet sulandırma sıvısıyla birlikte veya kutusuz olarak strafor içinde
10 doz liyofilize toz içeren tip I cam flakon ve 10 ml sulandırma sıvısıyla birlikte
20 doz liyofilize toz içeren tip I cam flakon ve 20 ml sulandırma sıvısıyla birlikte

RAF ÖMRÜ:

24 ay (2yıl)

İMHA ŞARTLARI:

Sulandırılıp kullanılmayan aşılama 15 dakika kaynatılarak imha edilir. Liyofilize şekildeki kullanılmayan aşılama ise imha için üretici kuruma iade edilir.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız



Dollvet

PROSEKTÜSÜN ONAY TARİHİ

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NUMARASI: 05.05.2009

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ:

Dollvet Veteriner Aşısı İlaç Biyolojik Madde Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mehmet Nesh Özmen Mah. Kasım Sok. D Blok Apt. No:7 Güngören/İSTANBUL
Telefon: +90 212 422 02 01 / Faks: +90 212 422 00 72

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ:

Dollvet Veteriner Aşısı İlaç Biyolojik Madde Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Koçören OSB Mahallesi 106. Cadde No:4 Eyyübiye/ŞANLIURFA
TEL: +90 414 369 11 33 / FAKS: +90 414 369 16 62

www.dollvet.com.tr / dollvet@dollvet.com.tr

Pr 017-02